

Lineare Abbildungen und Skalarprodukt - Lösungsvorschlag

Aufgabe 1 - Linearität

V, W endlichdimensionale \mathbb{C} -Vektorräume mit Basis B_V, B_W

1.) $V = \text{Spann}_{\mathbb{C}}(v_1, \dots, v_n) \Rightarrow \dim(V) = n$ **FALSCH**

Gegenbeispiel: $\mathbb{R}^2 = \text{Spann}_{\mathbb{R}}((1), (1), (1))$, $n=3$ aber $\dim \mathbb{R}^2 = 2$.

2.) $V = \text{Spann}_{\mathbb{C}}(v_1, \dots, v_n) \Rightarrow \dim(V) \leq n$ **WAHR**

3.) $V = \text{Spann}_{\mathbb{C}}(v_1, \dots, v_n) \Rightarrow \dim(V) \geq n$ **FALSCH**

4.) $L: V \rightarrow W$ linear und surjektiv $\Rightarrow \dim W = \dim V$ **FALSCH**

5.) $L: V \rightarrow W$ linear und injektiv $\Rightarrow \dim W = \dim V$ **FALSCH**

6.) $L: V \rightarrow W$ linear und bijektiv $\Rightarrow \dim W = \dim V$ **WAHR**

7.) $L: V \rightarrow W$ und $\text{Bild}(L) = W \Rightarrow L$ ist surjektiv **WAHR**

8.) $L: V \rightarrow W$ und $\text{Bild}(L) = W \Rightarrow L$ ist injektiv **FALSCH**

Gegenbeispiel: $L: \{0, 1\} \rightarrow \{0\}$

$0 \mapsto 0$
 $1 \mapsto 0$

$\text{Bild}(L) = \{0\}$,
aber L ist nicht injektiv

9.) Ist $L: V \rightarrow W$ linear und $\dim W = L$,
so hat die dazugehörige Matrix M_{B_W, B_V}^L Zeilen

$\begin{matrix} \in V & & \in W \\ \downarrow & & \downarrow \\ \left(\begin{array}{ccc|c} \hline \hline \hline \hline \hline \end{array} \right) & \left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \end{array} \right) & = & \left(\begin{array}{c} \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \\ \downarrow \end{array} \right) \end{matrix}$

10.) Ist $L: V \rightarrow W$ linear und $\dim W = L$,
so hat die dazugehörige Matrix M_{B_W, B_V}^L

11.) Jede Basiswechselmatrix ist quadratisch **WAHR**

12.) Jede Basiswechselmatrix ist invertierbar **WAHR**

Aufgabe 2 - Abbildungseigenschaften

Seien $x_1 < x_2 < \dots < x_n \in \mathbb{R}$ für $n \in \mathbb{N}$.

$P_{\mathbb{C}} \times \mathbb{Z}_2$ Vektorraum der Polynome
mit Grad ≤ 2 ($\mathbb{C}^2, \mathbb{Z}_2, 1$)
über \mathbb{R}

Lineare Abbildung: $L: P_{\mathbb{C}} \times \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$

Polynom $p \in P_{\mathbb{C}} \times \mathbb{Z}_2$

$p \mapsto \begin{pmatrix} p(x_1) \\ \vdots \\ p(x_n) \end{pmatrix}$

zerlege Polynom in Linearfaktoren:
 $p = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2)$
 $= x^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)x + \lambda_1 \lambda_2$

$n=1$ $L: p \mapsto p(x_1) \in \mathbb{R}$

Polynom, für das $\lambda_1 = x_1$ oder $\lambda_2 = x_1$ Nullstelle

dann ist der Kern von L : $\text{Ker}(L) = \{ \dots, \dots \}$, da

mit den Nullstellen des Polynoms λ_1, λ_2 : $p(x_1) = p(x_2) = 0$

Aufgabe 2

Bei dieser Aufgabe muss beachtet werden:

- $x_1 \dots x_n$ sind fest vorgegeben
- $x_1 \dots x_n$ sind alle verschieden
- $p = a_0 x^2 + a_1 x + a_2$ ist die Variable der Gleichung

a) Für $n=1$ suchen wir das $p = a_0 x^2 + a_1 x + a_2$ für welches $a_0 x_1^2 + a_1 x_1 + a_2 = 0$

Wir schreiben als Faktorisierung $(x_1 - \lambda_1)(x_1 - \lambda_2)$
 $= x_1^2 - (\lambda_1 + \lambda_2)x_1 + \lambda_1 \lambda_2$

Die Faktorisierung ist 0 für $x_1 = x_1 = \lambda_2$

Daher gilt für $p = 1 \cdot x^2 + (-(2x_1))x + 2x_1$ als einziges Element des Kerns.

$$\dim(\text{Kern}) = 0 \quad \text{Rang}(P(x_1)) = 1$$

$$\dim(\mathbb{R}^1) = 1$$

b) $\Rightarrow L$ ist injektiv ($\dim(\text{Kern}) = 0$)

$\Rightarrow L$ ist surjektiv ($\dim(W) = \text{Rang}(f)$)

$\Rightarrow L$ ist bijektiv

a) Für $n=2$ müssen beide Teile des Vektors

0 sein. Da $x_1 \neq x_2$ werden die Nullstellen

verschieden. Wie in $n=1$ gezeigt gilt

dies für $p = 1 x^2 + (x_1 + x_2)x + x_1 x_2$ als einziges Element des Kerns.

$$\dim(\text{Kern}) = 0 \quad \text{Rang}\left(\begin{pmatrix} P(x_1) \\ P(x_2) \end{pmatrix}\right) = 1$$

$$\dim(\mathbb{R}^2) = 2$$

b) $\Rightarrow L$ ist injektiv ($\dim(\text{Kern}) = 0$)

$\Rightarrow L$ ist nicht surjektiv ($\dim(W) \neq \text{Rang}(f)$)

$\Rightarrow L$ ist nicht bijektiv

a) Für $n \geq 3$ gilt $x_1 \neq x_2 \neq x_3 \dots$ was bedeutet, dass wir 3 verschiedene Nullstellen mit dem Polynom p abdecken müssen. Da ein Polynom von Grad 2 maximal 2 Nullstellen besitzt, ist der Kern von L leer.

$$\text{Kern} = \emptyset$$

$$\text{Dim}(\mathbb{R}^3) = 3$$

$$\text{Dim} \left(\begin{pmatrix} p(x_1) \\ p(x_2) \\ p(x_3) \end{pmatrix} \right) = 1$$

$\Rightarrow L$ ist nicht injektiv ($\text{Dim}(\text{Kern}) \neq 0$)

$\Rightarrow L$ ist nicht surjektiv ($\text{Dim}(W) \neq \text{Rang}(L)$)

$\Rightarrow L$ ist nicht bijektiv

Aufgabe 3 - Kern, Bild und Rang

$$E = \{ e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \} \quad \text{kanonische Basis des } \mathbb{R}^3$$

Lineare Abbildung $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definiert durch

$$T(e_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T(e_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$T(e_3) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Wir konstruieren die Abbildungsmatrix:

Es muss eine 2×3 -Matrix sein, da $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, $\dim \mathbb{R}^2 = 2$

$$\begin{pmatrix} t_{1j} \\ t_{2j} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_{11} \\ t_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\uparrow \uparrow$
Zeile Spalte

$$\begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_{12} \\ t_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_{13} \\ t_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Also ist $T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

a) Wir bringen T auf Zeilenstufenform

$$T \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Rang}(T) = 2$$

b) Der Kern von T ist die Lösung des LGS
(der Lösungsvorrat)

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

Gauß: $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, also $3x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$

$$\text{Kern}(T) = \text{Span}_{\mathbb{R}} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\dim \text{Kern}(T) = 1$$

$$2x_1 + 0 + 4x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -2x_3$$

wähle $x_3 = -1 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

c) Dimensionsformel

$$\dim V = \text{Rang}(T) + \text{Kern}(T)$$


$$3 = 2 + 1 \quad \checkmark$$

Zusatz:

d) Definition des Kerns: Sei $T: V \rightarrow W$ (Lineare) Abbildung

$$\text{Ker}(CT) := \{ v \in V : T(v) = \vec{0} \} = F^{-1}(\vec{0}) \subseteq V$$

(Urbild des Nullvektors in W)



e) zu zeigen: $\text{Ker}(CT)$ ist ein Untervektorraum

Beweis z.z. UVO: $\text{Ker}(CT) \neq \emptyset$, da $\{0\} \subseteq \text{Ker}(CT)$ für lineare Abbildungen, da $T(0) = 0$.

z.z. UV1: $v \in \text{Ker}(CT), w \in \text{Ker}(CT) \Rightarrow v+w \in \text{Ker}(CT)$

$$T(v+w) = T(v) + T(w) = 0 + 0 = 0$$

\uparrow
T linear

\uparrow
0 neutrales Element der Addition

$\Rightarrow v+w$ bildet auf 0 ab, ist also $\in \text{Ker}(CT)$.

z.z. UV2 $v \in \text{Ker}(CT), \lambda \in K \Rightarrow \lambda \cdot v \in \text{Ker}(CT)$

$$T(\lambda \cdot v) = \lambda \cdot T(v) = \lambda \cdot 0 = 0$$

\uparrow
T linear

\uparrow
 $v \in \text{Ker}(CT)$

\uparrow
 $0 \cdot \lambda = 0$ im Vektorraum

$\Rightarrow \lambda \cdot v \in \text{Ker}(CT)$

f) Definition des Bildes von T

$T: V \rightarrow W$ (Lineare) Abbildung


$$\text{Bild von } T: T(V) := \{ w \in W : \exists v \in V \text{ mit } T(v) = w \}$$

g) zu zeigen: $\text{Bild}(CT)$ ist ein Untervektorraum

z.z. UVO: $\text{Bild}(CT) \neq \emptyset$ folgt aus der Definition des Bildes

z.z. UV1: $v \in \text{Bild}(CT), w \in \text{Bild}(CT) \Rightarrow v+w \in \text{Bild}(CT)$

Seien $v = T(x)$ und $w = T(y)$; $x, y \in V$
 $v+w = T(x) + T(y) = T(x+y) \in \text{Bild}(CT)$
 \uparrow
T linear



z.z. UV2: $v \in \text{Bild}(CT), \lambda \in K \Rightarrow \lambda \cdot v \in \text{Bild}(CT)$

Sei $v = T(x)$, $x \in V$.

$$\lambda \cdot v = \lambda \cdot T(x) = T(\lambda \cdot x) \in \text{Bild}(CT)$$

Aufgabe 4 - Matrixmultiplikation

$$a) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+2 & 2+3 \\ 1+8 & 1+12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 9 & 13 \end{pmatrix}$$

$$b) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1 & 2+2 \\ 6+ & 12+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ & 16 \end{pmatrix}$$

$$c) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 12 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 5 & 20 \\ 12 & 6 & 27 \\ 17 & 6 & 17 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 5 - Inverses

$$L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad x \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} x$$

Wir berechnen die Inverse

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{z_3 \leftarrow \frac{1}{2} z_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{z_2 \leftarrow \frac{1}{2}(z_2 + z_3)} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \xrightarrow{z_1 = z_1 - 2z_2 - 2z_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & -1 & -3/2 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

A^{-1}

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -3/2 \\ 0 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 6 - Basiswechselmatrix

$$L: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$$

$$L: \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \mapsto L \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \\ -2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \\ x_3 - x_4 \end{pmatrix}$$

$$a) E := \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ kanonische Basis des } \mathbb{R}^4$$

$${}^E M_L^E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Rechentipp: Matrixmultiplikation im Kopf vorstellen

$$\begin{pmatrix} \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | \\ | \\ | \\ | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix}$$

b) Basiswechselmatrixen zur Basis $B = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

$${}^B M_{id}^E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

WICHTIGER Satz aus Vorlesung:

Die Spalten der darstellenden Matrix sind die Bilder der Basisvektoren

"von rechts nach links"

da $({}^B M_{id}^E) v_E$

Matrixmultiplikation von rechts definiert ist für Vektor v

$${}^E M_{id}^B = ({}^B M_{id}^E)^{-1}$$

Also invertiere ${}^B M_{id}^E$:

"Vektor in E geht rein"

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ {}^B M_{id}^E \\ \downarrow \end{array}$$

"Vektor in B geht raus"

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\rightsquigarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \underbrace{\quad}_{({}^B M_{id}^E)^{-1}}$$

$${}^E M_{id}^B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Bilinearformen

Aufgabe 7 - Bilinearität

$$u := \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad v := \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Definiere } u_1 := \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad u_2 := \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

a) $S(u, v) = x_1 y_1 + 2x_2 y_1 + 2x_1 y_2 + 6x_2 y_2$

$$S(u_1 + u_2, v) = (x_1 + z_1) y_1 + 2(x_2 + z_2) y_1 + 2(x_1 + z_1) y_2 + 6(x_2 + z_2) y_2$$

$$= (x_1 y_1 + z_1 y_1 + 2x_2 y_1 + 2z_2 y_1 + 2x_1 y_2 + 2z_1 y_2 + 6x_2 y_2 + 6z_2 y_2) \cdot \lambda$$

$$= \lambda (S(u_1, v) + S(u_2, v))$$

(ebenso in 2. Komponente)

Aufgabe 7 - Bilineare Formen (Fortsetzung)

$$b) \quad S(u, v) = 6x_1y_1 + y_1y_2$$

$$\text{Sei } u := \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad v := \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad w := \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}, \quad \lambda \in K$$

$$\begin{aligned} \text{dann } S(u, v+w) &= 6x_1(y_1 + z_1) + (y_1 + z_1) \cdot (y_2 + z_2) \\ &= 6x_1y_1 + 6x_1z_1 + y_1y_2 + y_1z_2 + z_1y_2 + z_1z_2 \end{aligned}$$

$$\neq S(u, v) + S(u, w) = 6x_1y_1 + y_1y_2 + 6x_1z_1 + z_1z_2$$

\Rightarrow keine Bilinearform

$$c) \quad S(u, v) = x_1y_1 + 3x_2y_1 + x_2y_2 - 3x_1y_2$$

$$u := \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad v := \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad w := \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} S(\alpha(u+v), w) &= \alpha(x_1 + y_1)z_1 + 3\alpha(x_2 + y_2)z_1 + \alpha(x_2 + y_2)z_2 - 3\alpha(x_1 + y_1)z_2 \\ &= \alpha(x_1z_1 + y_1z_1 + 3x_2z_1 + 3y_2z_1 + x_2z_2 + y_2z_2 \\ &\quad - 3x_1z_2 - 3y_1z_2) \end{aligned}$$

$$= \alpha(S(u, w) + S(v, w))$$

ebenso: Linearität bzgl. 2. Komponente

Aufgabe 8:

a) 1) Bestimme Basis $E = 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$
 $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ und Normalenvektor $n = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$
 \hookrightarrow durch test einsetzen \hookrightarrow auskoeffizienten

2) $h_1 = P_w(g_1) = \left\langle \begin{pmatrix} 1+2\lambda \\ \lambda \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \left\langle \begin{pmatrix} 1+2\lambda \\ \lambda \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 1+2\lambda \\ 0 \\ -1-2\lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 4\lambda \\ 2\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$

$h_2 = \left\langle \begin{pmatrix} 3-\lambda \\ 0 \\ \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 3-\lambda \\ 0 \\ \lambda \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 3-2\lambda \\ 0 \\ -3+2\lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2\lambda \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

3) Das projizierte Bild einer Geraden kann ein einzelner Punkt sein, wenn die Gerade senkrecht zur Projektions ebene liegt.

b) $h_1 = h_2 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 2 & 2 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{matrix} \mu = 2/3 \\ \lambda = 1/3 \end{matrix}$

$\Rightarrow S = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + 2/3 \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/3 \\ 4/3 \\ -1 \end{pmatrix}$

c) $S_{g_1} = S + \alpha \cdot n = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 5/3 \\ 4/3 \\ -1 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2\lambda \\ \lambda \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \alpha = 1/2 \\ \lambda = 5/6 \end{matrix}$
 $= \begin{pmatrix} 1+2 \cdot 5/6 \\ 5/6 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8/3 \\ 5/6 \\ 0 \end{pmatrix}$

$S_{g_2} = S + \beta \cdot n = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 5/3 \\ 4/3 \\ -1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-\mu \\ 0 \\ \mu \end{pmatrix} \Rightarrow \beta = 4/3, \mu = 5/3$
 $= \begin{pmatrix} 13/3 \\ 0 \\ 5/3 \end{pmatrix}$

d) g_1 und g_2 besitzen keinen Schnittpunkt, da dieser auf S projiziert worden wäre und die Urbilder des Schnittpunktes verschieden sind.

Zusatz: Abbildungsmatrix A zur Projektion

1) Projiziere alle Basisvektoren von \mathbb{R}^3

$$\vec{a}_1 = P_W(e_1) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + 0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a}_2 = P_W(e_2) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= 0 + \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a}_3 = P_W(e_3) = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$A = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

2) projiziere g_1 $h_1 = A g_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1+2\lambda \\ \lambda \\ 0 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 1+2\lambda \\ 4\lambda \\ -1+2\lambda+2\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 9

Bist genau dann Orthonormalbasis eines Vektorraums V , wenn gilt:

- (1) Bist Basis von V und
(2) $\forall b_i, b_j \quad \langle b_i, b_j \rangle = \begin{cases} 0 & \text{für } i \neq j \\ 1 & \text{für } i = j \end{cases}$

Aufgabe 10

$$(1) u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) w_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} - \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$(3) w_3 = v_3 - \langle v_3, u_1 \rangle u_1 - \langle v_3, u_2 \rangle u_2$$
$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{6}} \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{4} \cdot 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{6} \cdot 9 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3/2 \\ 0 \\ 3/2 \end{pmatrix}$$

$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{3/2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 3/2 \\ 0 \\ 3/2 \end{pmatrix}$$